



VEGETAZIONE

SCALA:			1:10.000	
ADOZIONE D.C.C. n°94	APPROVAZIONE D.C.C. n°154	TAV. N°	4.2 SUD	
DATA			15 GENNAIO 2003	

Legenda

- | |
|--|
| Confine.shp |
| Fa: Boschi mesofili a dominanza di faggio |
| Cas: Castagneti cedui |
| Caf: Castagneti da frutto |
| Cb: Boschi mesofili a dominanza di carpino bianco |
| Qc: Boschi a dominanza di cerro |
| Qp: Boschi a dominanza di roverella |
| Qn: Boschi a dominanza di carpino nero |
| Bm: Boschi misti di latifoglie termofile |
| Bt: Boschi misti di latifoglie mesofile |
| Bn: Boschi a dominanza di betulla |
| Fa: Formazioni arboree igrofile e riparie |
| R: Formazioni sinantropiche a dominanza di robinia |
| Rb: Rimboscimenti di conifere |
| Bt: Boschi misti di conifere e latifoglie |
| Bc: Boschi misti di conifere e sclerofille |
| Arb1: Arbusteti di degradazione o di ricolonizzazione su suoli acidi |
| Arb2: Arbusteti di degradazione o di ricolonizzazione su suoli basici o neutri |
| Arb3: Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi |
| Pr: Prati secondari xerofili |
| Px: Prati secondari xerofili arbustati |
| V: Vegetazione rada dei litorali, delle aree calcaree e delle zone in erosione |
| Pm: Prati perenni mesofili, prati-pascolo e prati sfalcati |
| Pmx: Prati perenni mesofili, prati-pascolo e prati sfalcati arbustati |
| Fer: Formazioni erbacee riparie |
| Fer: Formazioni erbacee ruderali e sinantropiche |
| Cs: Collinazioni erbacee |
| Cs: Collinazioni arboree |
| P: Rimboscimenti di latifoglie (prospete, arboricoltura da legno) |
| G: Prati e giardini pubblici, aree a verde ornamentale |
| Ne: Cfr. Fluvia |
| S: Inodi |
| I: Scogli ed elementi vegetazionali arborei ed arbustivi a sviluppo lineare |
| U: Aree urbanizzate (centri abitati ed edificato sparso) e relative pertinenze |
| C: Cave |
| Rv: Rive rivaia |
| Totale_cadisp.shp |

